


DET ER VIGTIGT AT PÅSÆTTE SERESTO VET. KORREKT

- Det er vigtigt, at Seresto vet. påsættes korrekt, for at sikre maksimal effekt, komfort og sikkerhed.
- Ved korrekt påsætning skal der kunne være 2 fingre mellem Halsbånd og hundens/kattens nakke. Halsbåndet skal være i kontakt med huden og må ikke sidde for løst.
- Halsbåndet skal bæres konstant i hele beskyttelsesperioden, og skal ikke tages af og på gentagne gange.

Påsætning af Seresto vet.

- 1 Fjern Halsbåndet fra posen. Rul Halsbåndet ud og kontrollér, at der ikke sidder rester fra plastklåsene i Halsbåndet.
- 2 Sæt Halsbåndet rundt om dyrets hals, og træk den ene ende gennem begge løkker.
- 3 Justér Halsbåndet om dyrets hals (to fingre skal kunne være mellem Halsbåndet og halsen). Træk overskydende Halsbånd gennem løkken.
- 4 Når Halsbåndet sidder korrekt, så afklip det stykke, der stikker mere end 2 cm ud. Hos voksende dyr kan evt. efterlades et længere stykke til fremtidige justeringer af Halsbåndet.



SERESTO VET. HALSBÅND HAR REPELLERENDE („NO-BITE“) EFFEKT MOD FLÅTER



Seresto Vet., Halsbånd til katte og hunde ≤ 8 kg (1,25 g imidacloprid og 0,56 g flumethrin) **Seresto Vet., Halsbånd til hunde > 8 kg** (4,5 g imidacloprid og 2,03 g flumethrin). ATCvet-kode: QP53AC55 **Indikationer:** Til behandling og forebyggelse af loppeangreb (*Ctenocephalides felis* (hund og kat) og *C. canis* (hund)) hos hunde og katte i 7-8 måneder. Beskytter i dyrets nære omgivelser mod udvikling af loppelarver i 10 uger hos katte og 8 måneder hos hunde. Seresto Vet. kan anvendes som en del af behandlingsstrategien ved lopperbetting allergisk dermatitis. Seresto Vet. har en vedvarende acaricid (dræbende) virkning mod flåter (*Ixodes ricinus* (hund og kat), *Rhipicephalus sanguineus* (hund), *Rhipicephalus turanicus* (katte), *Dermacentor reticulatus* (hund)) og repellerende (forhindrer blodsugning) virkning mod flåter *Ixodes ricinus* (hund og kat), *Rhipicephalus sanguineus* (hund) i 8 måneder. Produktet er virksomt mod larver, nymfer og voksne flåter. Produktet giver en indirekte beskyttelse mod overførsel af *Babesia canis vogeli* og *Ehrlichia canis* fra flåtarten *Rhipicephalus sanguineus*. Hermed mindskes risikoen for babesiose og ehrlichiose hos hunde i 7 måneder. Reducerer risikoen for infektion med *Leishmania infantum* ved overførsel via sandfluer i op til 8 måneder hos hund. Til bekæmpelse af angreb af bidende lus (*Trichodectes canis*) hos hunde. For bedste resultat bør Halsbåndet sættes på, før flåt- eller loppesæsonen begynder. **Kontraindikationer:** Killinger under 10 uger og hvalpe under 7 uger må ikke behandles. Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne. **Drægtighed og laktation:** Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt hos de dyr præparatet er beregnet til. I fravær af data anbefales det ikke at bruge præparatet til drægtige eller diegivende hunkatte eller tæver. **Advarsler og forsigtighedsregler:** Som ved alle langtidsvirkende topikale produkter, kan sæsonbetiget fældning føre til en forbigående, mindre reduktion af virkningen pga. tab af aktivt stof bundet i pelsen. Ny fordeling fra Halsbåndet sker omgående således, at fuld virkning vil blive genetableret uden yderligere behandling eller skift af Halsbåndet. Halsbåndet er vandafvisende og virker, selv hvis dyret bliver vådt. Dog bør dyret ikke udsættes for store mængder vand i længere tid eller hyppig vask, da virkningstiden dermed kan nedsættes. Som med andre veterinære lægemidler må små børn ikke lege med Halsbåndet eller putte det i munden. Kæledyr, der bærer Halsbåndet, bør ikke gives lov til at sove sammen med deres ejere, især ikke børn. Imidacloprid og flumethrin frigives kontinuerligt fra Halsbåndet til hud og pels så længe Halsbåndet bæres. Halsbåndet kan udløse overfølsomhedsreaktioner hos visse personer. Personer med kendt overfølsomhed (allergi) over for stofferne i Halsbåndet bør undgå kontakt med Halsbåndet. Halsbåndet kan i meget sjældne tilfælde give irritation på hud, i øjne og luftveje hos visse personer. I tilfælde af øjenirritation skylles øjnene grundigt med koldt vand. I tilfælde af hudirritation vaskes huden med koldt vand og sæbe. Vedvarer symptomerne anbefales det at søge læge og vise lægen indlægssedlen eller pakningen. Kassér alle rester eller afklippede dele af Halsbåndet med det samme. Vask hænderne med koldt vand efter at have fastgjort Halsbåndet. **Bivirkninger:** Hos dyr, der ikke er vant til at bære Halsbånd, kan adfærdændringer, som f.eks. at gemme sig, vokalisering, hyperaktivitet, overdreven slikning og/eller pelspleje og kradsen omkring Halsbåndet, lejlighedsvis forekomme i de første dage efter Halsbåndet er sat på. I meget sjældne tilfælde er aggression rapporteret efter at Halsbåndet er sat på. Kontrollér, at Halsbåndet ikke er for stramt. Reaktionen som f.eks. pruritus, erythem og hårtab omkring Halsbåndet kan opstå. Disse tilfælde er sjældne hos hund og ualmindelige hos kat og bedring ses sædvanligvis inden for en til to uger. I enkelte tilfælde kan det tilrådes midlertidigt at fjerne Halsbåndet indtil symptomerne er forsvundet. I meget sjældne tilfælde kan der hos hund og i sjældne tilfælde hos kat opstå reaktioner som dermatitis, inflammation, eksem, hudlæsioner eller blødning omkring Halsbåndet. I disse tilfælde anbefales det at Halsbåndet fjernes. I sjældne tilfælde kan neurologiske symptomer som ataksi, kramper og tremor forekomme hos hunde. I disse tilfælde anbefales det at fjerne Halsbåndet. Hos hunde og katte kan der i starten, i sjældne tilfælde, ses lette og forbigående reaktioner så som depression, ændret spisemønster, savlen, opkast og diarré. Som ved andre produkter, der påføres huden, kan der hos hypersensitive dyr opstå kontaktdermatitis. **Dosis og indgivelsesmåde:** Kutan anvendelse. Ét Halsbånd pr. dyr, fastgøres om halsen. Til hunde over 8 kg anvendes et Seresto Vet Halsbånd på 70 cm. Til små hunde på op til 8 kg kropsvægt og til katte anvendes Seresto Vet. til katte og hunde ≤ 8 kg på 38 cm. Kun til udvortes brug. Halsbåndet skal bæres konstant i beskyttelsesperioden på otte måneder og bør fjernes efter behandlingsperioden. Kontrollér jævnligt, og justér størrelsen, især hos killinger/hvalpe, der vokser hurtigt. Dette Halsbånd er designet med et sikkerhedslåsesystem. I de meget sjældne tilfælde hvor en kat eller i de ekstremt sjældne tilfælde hvor en hund sidder fast, kan dyret normalt ved egen hjælp udvide Halsbåndet og hurtigt komme fri. **Pakninger:** Seresto Vet. til katte og hunde ≤ 8 kg: 1 Halsbånd, Seresto Vet. til hunde > 8 kg: 1 Halsbånd. **Indehaver af markedsføringstilladelse:** Bayer Animal Health GmbH, D-51 368 Leverkusen, Tyskland. **Udlevering:** HV. TEKSTEN ER OMSKREVET OG FORKORTET I FORHOLD TIL DET AF LÆGEMIDDELSTYRELSEN GODKENDETE PRODUKTRESUMÉ AF 15. NOVEMBER 2021. **PRODUKTRESUMÉET KAN VEDERLAGSFRIT REKVIRERES FRA ELANCO. Forhandles af:** Elanco Denmark ApS, Lautrupvang 12, 2750 Ballerup. Telefon 45 26 60 60. DKMISER1221p

OP TIL 8 MÅNEDERS BESKYTTELSE MOD FLÅTER, LOPPER OG VEKTORBÅRNE SYGDOMME*



NEMT AT ANVENDE



BESKYTTER I OP TIL 8 MÅNEDER



MINDSKER RISIKOEN FOR VEKTORBÅRNE SYGDOMME*




VAND-AFVISENDE



SIKKERHEDS-MEKANISME

STORT HALSBÅND HUND > 8 KG



LILLE HALSBÅND HUND ≤ 8 KG OG KAT




INDIKATIONER HUND


FLÅTER 	Dræber	Repellerer	Virketid
<i>Ixodes ricinus</i>	✓	✓	8 måneder
<i>Rhipicephalus sanguineus</i>	✓	✓	8 måneder
<i>Dermacentor reticulatus</i>	✓		8 måneder

VEKTORBÅRNE SYGDOMME*  	Reducerer risiko for overførsel	Virketid
<i>Leishmania infantum</i>	✓	8 måneder
<i>Babesia canis vogeli</i>	✓	7 måneder
<i>Ehrlichia canis</i>	✓	7 måneder

LOPPER 	Dræber	Virketid
<i>Ctenocephalides felis</i>	✓	7-8 måneder
<i>Ctenocephalides canis</i>	✓	7-8 måneder

INDIKATIONER KAT

FLÅTER 	Dræber	Repellerer	Virketid
<i>Ixodes ricinus</i>	✓	✓	8 måneder
<i>Rhipicephalus turanicus</i>	✓		8 måneder

LOPPER 	Dræber	Virketid
<i>Ctenocephalides felis</i>	✓	7-8 måneder





- Repellerende („no-bite“) og dræbende effekt mod flåter i 8 måneder. Flåten afvises ved kontakt med flumethrinen på huden og i pelsen. Flåten falder af, som regel før den når at bide
- Behandler og beskytter mod loppeangreb i op til 8 måneder og beskytter dyrets nære omgivelser mod udviklingen af loppelarver ved kontakt med det behandlede dyr**
- Beskytter indirekte mod overførsel af vektorbårne sygdomme (se skemaet ovenfor) i op til 8 måneder hos hund
- Vandafvisende. Halsbåndet skal ikke tages af ved bad

** Hos hunde i 8 måneder og hos katte i 10 uger.

DE AKTIVE STOFFER FRIGIVES KONTINUERLIGT I LAVE KONCENTRATIONER OVER 8 MÅNEDER

OP TIL
8
MÅNEDERS
BESKYTTELSE



DEPOT FORMULERING

- Frigivelse af de aktive ingredienser sker først, når halsbåndet påsættes

FØRSTE PÅSÆTNING

- De aktive ingredienser migrerer til halsbåndets overflade, der har kontakt til hundens hud

FRIGIVELSE AF AKTIVE INGREDIENSER

- De aktive ingredienser overføres fra halsbåndet til lipidlaget i huden og pelsen
- De aktive ingredienser fordeles i lipidlaget i hele hudoverfladen

VEDVARENDE BESKYTTELSE

- De aktive ingredienser vil kontinuerligt migrere fra Seresto vet. til lipidlaget efter behov
- Fortsat optimal acaricid/insekticid beskyttelse i op til 8 måneder ved **kontinuerlig og lav** frigivelse af de aktive stoffer

2-TRINS SIKKERHEDSMEKANISME

- Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at halsbåndet til kat og lille hund har en 2-trins sikkerhedsmekanisme, der minimerer risikoen for at hunden eller katten kommer til skade
- Til den større og tungere hund over 8 kg er én sikkerhedsmekanisme nok til, at der ikke er risiko for, at den sidder fast i en gren eller tilsvarende.

